

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Material suplementario S1. Características de los participantes con la infección por VIH y VHB según el uso de antirretrovirales

Variables	Uso de antirretrovirales			Valor de p
	Global	No usa antirretrovirales	Usa antirretrovirales	
	N = 106 n (%)	N = 59 n (%)	N = 47 n (%)	
Edad				0,680 ^a
18 a 29 años	41 (39,42)	23 (39,66)	18 (39,13)	
30 a 39 años	40 (38,46)	25 (43,10)	15 (32,61)	
40 a 49 años	14 (13,46)	6 (10,34)	8 (17,39)	
50 a 59 años	4 (3,85)	2 (3,45)	2 (4,35)	
60 a 69 años	5 (4,81)	2 (3,45)	3 (6,52)	
Datos ausentes	2	1	1	
Edad al diagnóstico de VIH ^b	32,0 (26,0 - 38,0)	32,0 (26,2 - 37,0)	32,0 (26,5 - 41,5)	0,631 ^c
Datos ausentes	1	1	0	
Edad al diagnóstico de VHB ^b	32,0 (26,0 - 37,0)	33,0 (26,0 - 37,0)	31,0 (26,5 - 40,5)	0,860 ^c
Datos ausentes	12	4	8	
Tiempo hasta el diagnóstico (años)				0,236 ^a
< 12 meses	68 (64,76)	41 (69,49)	27 (58,70)	
12 a 23 meses	28 (26,67)	12 (20,34)	16 (34,78)	
≥ 24 meses	9 (8,57)	6 (10,17)	3 (6,52)	
Datos ausentes	1	0	1	
Región de residencia				1,000 ^a
Costa	68 (66,02)	38 (65,52)	30 (66,67)	
Sierra	30 (29,13)	17 (29,31)	13 (28,89)	
Selva	5 (4,85)	3 (5,17)	2 (4,44)	
Datos ausentes	3	1	2	
Participantes que se atendieron en un departamento distinto al departamento de residencia	10 (10,87)	5 (9,43)	5 (12,82)	0,738 ^a
Datos ausentes	14	6	8	
SIDA	25 (23,58)	13 (22,03)	12 (25,53)	0,673 ^d
Vía de transmisión de VIH				1,000 ^a
Sexual	96 (90,57)	53 (89,83)	43 (91,49)	
Desconocida	10 (9,43)	6 (10,17)	4 (8,51)	

^aPrueba exacta de Fisher.

^bMediana (RIQ).

^cPrueba U de Mann-Whitney.

^dPrueba chi cuadrado de independencia.

^eEn ningún participante se registró datos para la categoría 24 a 35 meses.

Material suplementario S2. Características de los participantes con la infección por VIH y VHB según el año de diagnóstico

Variables ^a	Año de diagnóstico				Valor de <i>p</i>
	2017, N = 13 n (%)	2018, N = 34 n (%)	2019, N = 38 n (%)	2020, N = 16 n (%)	
Edadb	33,5 (26,5 - 38,2)	31,0 (27,0 - 40,0)	32,0 (26,2 - 35,8)	35,5 (29,0 - 40,8)	0,603 ³
Datos ausentes	1	0	0	0	
Sexo					0,141 ^d
Masculino	9 (69,23)	31 (91,18)	35 (92,11)	15 (93,75)	
Femenino	4 (30,77)	3 (8,82)	3 (7,89)	1 (6,25)	
Tiempo hasta el diagnóstico (años)					0,350 ^d
< 12 meses	9 (69,23)	24 (70,59)	23 (60,53)	12 (75,00)	
12 a 23 meses	3 (23,08)	10 (29,41)	12 (31,58)	2 (12,50)	
≥ 24 meses	1 (7,69)	0 (0,00)	3 (7,89)	2 (12,50)	0,081 ^d
Región de residencia					
Costa	5 (38,46)	25 (75,76)	24 (64,86)	13 (81,25)	
Sierra	8 (61,54)	6 (18,18)	11 (29,73)	2 (12,50)	
Selva	0 (0,00)	2 (6,06)	2 (5,41)	1 (6,25)	
Datos ausentes	0	1	1	0	0,373 ^d
Participantes que se atendieron en un departamento distinto al departamento de residencia	1 (7,69)	2 (6,90)	4 (11,43)	3 (27,27)	
Datos ausentes	0	5	3	5	0,247 ^e
Uso de antirretrovirales	4 (30,77)	12 (35,29)	21 (55,26)	8 (50,00)	0,185 ^d
SIDA	5 (38,46)	10 (29,41)	5 (13,16)	4 (25,00)	

^aEn este análisis se excluyó el año 2021.

^bMediana (RIQ).

^cPrueba de Kruskal-Wallis.

^dPrueba exacta de Fisher.

^ePrueba chi cuadrado de independencia.

Material suplementario S3. Características de los participantes con la infección por VIH y VHB según el orden de diagnóstico

Variables	Orden de diagnóstico				Valor de p
	Global N = 105	El mismo año N = 68	Primero VHB N = 14	Primero VIH N = 23	
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
Edada	32,0 (27,0 - 38,2)	32,0 (26,0 - 39,0)	32,0 (29,2 - 38,8)	31,0 (28,5 - 36,5)	0,951 ^b
Datos ausentes	1	1	0	0	
Sexo					0,038 ^c
Masculino	92 (87,62)	63 (92,65)	10 (71,43)	19 (82,61)	
Femenino	13 (12,38)	5 (7,35)	4 (28,57)	4 (17,39)	
Año de diagnóstico					0,008 ^c
2017	13 (12,38)	9 (13,24)	4 (28,57)	0 (0,00)	
2018	34 (32,38)	24 (35,29)	2 (14,29)	8 (34,78)	
2019	38 (36,19)	23 (33,82)	6 (42,86)	9 (39,13)	
2020	16 (15,24)	12 (17,65)	2 (14,29)	2 (8,70)	
2021	4 (3,81)	0 (0,00)	0 (0,00)	4 (17,39)	
Tiempo hasta el diagnóstico (años)					<0,001 ^c
< 12 meses	68 (64,76)	68 (100,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	
12 a 23 meses	28 (26,67)	0 (0,00)	9 (64,29)	19 (82,61)	
≥ 24 meses	9 (8,57)	0 (0,00)	5 (35,71)	4 (17,39)	
Región de residencia					0,007 ^c
Costa	68 (66,02)	49 (73,13)	4 (28,57)	15 (68,18)	
Sierra	30 (29,13)	16 (23,88)	7 (50,00)	7 (31,82)	
Selva	5 (4,85)	2 (2,99)	3 (21,43)	0 (0,00)	0,277 ^c
Datos ausentes	2	1	0	1	0,513 ^d
SIDA	24 (22,86)	19 (27,94)	2 (14,29)	3 (13,04)	0,881 ^c
Uso de antirretrovirales	46 (43,81)	27 (39,71)	7 (50,00)	12 (52,17)	
Vía de transmisión de VIH					0,192 ^c
Sexual	95 (90,48)	62 (91,18)	13 (92,86)	20 (86,96)	
Desconocida	10 (9,52)	6 (8,82)	1 (7,14)	3 (13,04)	
Año de diagnóstico de SIDA					
2016	1 (4,17)	0 (0,00)	0 (0,00)	1 (33,33)	
2017	5 (20,83)	4 (21,05)	1 (50,00)	0 (0,00)	
2018	10 (41,67)	8 (42,11)	0 (0,00)	2 (66,67)	
2019	4 (16,67)	3 (15,79)	1 (50,00)	0 (0,00)	
2020	4 (16,67)	4 (21,05)	0 (0,00)	0 (0,00)	
Datos ausentes	81	49	12	20	

^aMediana (RIQ).

^bPrueba de Kruskal-Wallis.

^cPrueba exacta de Fisher.

^dPrueba chi cuadrado de independencia.